

防蜂四大守則

一、預防蜂螫：

進入可能有虎頭蜂出沒之山區，應穿著長袖衣物與帽子，盡量減少皮膚露出，可以利用含 DEET 的防蚊液防蜂，若有蜂在身邊快速繞圈飛行時，可能遭遇巡邏蜂，表示在鄰近有蜂巢，應立刻緩慢安靜的離開現場，不要大動作驅趕，容易引起警戒蜂注意，釋放費洛蒙引發大蜂群攻擊。

二、蜂巢通報：

如有蜂巢需要摘除，請撥打(管理機關電話)進行通報，(管理機關)將委託專業人員協助處理，請切勿自行處理。

三、遭受攻擊：

如不小心引起蜂攻擊，立刻朝反向迅速逃離，盡量壓低身體並遮掩身上裸露部位，並不要大動作驅趕。若是多人一起遭遇，應朝反向分散逃離，遠離現場直至蜂群停止追擊。

四、蜂螫處理：

1、遭遇蜂螫不得輕忽危險，應立即通報119盡速送醫。

2、現場令傷者躺平，處理先將可見之螫針以指甲或卡片小心去除，注意不要擠壓毒囊。

3、以肥皂水、消毒水或是清水清理傷口，抬高被螫處並冰敷緩解疼痛。

4、狀況嚴重者，可使用過敏性休克的處理用藥(如腎上腺素等)，防止急性休克症狀。

5、曾有蜂螫過敏者，應隨身攜帶過敏性休克藥劑，已被不時之需。

管理機關：

電話：

